Аналитические материалы о вылове тихоокеанских лососей на 06.06.2017 г.

По состоянию на 6 июня 2017 г. общий вылов тихоокеанских лососей составляет 3,0 тыс. т. Промысел ведется в Камчатском крае и в Сахалинской области (рис. 1, табл.).



Рис. 1. Районы промысла и вылов тихоокеанских лососей по состоянию на 6 июня 2017 г.

Таблица. Вылов тихоокеанских лососей в Камчатском крае по состоянию на 6 июня 2017 г., тонн

Подзона	Год/вид											
	2016				2017				Δ 2017 к 2016 г., %			
	кета	нерка	чавыча	сима	кета	нерка	чавыча	сима	кета	нерка	чавыча	сима
Камчатский край												
Камчатско-Курильская	–	0,10	0,84	–	–	–	0,10	–	–	–	–88,00	–
Западно-Камчатская	0,10	–	0,03	–	0,65	–	–	–	+560,20	–	–	–
Петропавловско-Командорская	3,03	698,57	41,46	–	1,48	2915,23	50,05	–	–51,20	+317,30	+20,70	–
Сахалинская область												
Восточно-Сахалинская	–	–	–	–	–	–	–	0,8	–	–	–	–

Традиционно в начале путины по объемам добычи тихоокеанских лососей лидирует Камчатский край. Основу вылова формирует нерка. Ее промысел ведется в Петропавловско-Командорской подзоне и сконцентрирован на РПУ, расположенных в Камчатском заливе. В текущем году в I пятидневке июня этого ценного лосося добыто в почти 4 раза больше, чем в 2016 г. В прошлом году близкий по уровню объем вылова был получен во II пятидневке июня (табл., рис. 2).



Рис. 2. Динамика вылова нерки в Петропавловско-Командорской подзоне в 2016 и 2017 гг.

Данные о вылове кеты и чавычи свидетельствуют о том, что их нерестовая миграция только начинается (табл.).

В Сахалинской области добыто 0,8 т симы. Ее вылов ведется в Восточно-Сахалинской подзоне (табл.).

Аналитические материалы подготовлены на основании данных, представленных Северо-Восточным и Сахалино-Курильским теруправлениями Росрыболовста.